


[H] Chinese

Vol XII

12

V. 21





唐王壽先生外臺祕要方卷三十一目錄

採藥時節所出土地諸家丸散酒煎解諸毒等二十三門

採藥時節一首

藥所出州土一首

用藥分兩煮湯生熟法則一十六首

古今諸家丸方一十八首

古今諸家散方六首

古今諸家膏方四首

古今諸家煎方六首

古今諸家酒方一十二首

解飲食相害成病百件

尚德按二首下疑脫並代茶飲列於下七小字

食魚中毒及食鱸不消方五首

食椒菜瓠中毒方四首

解一切食中毒方三首

酒醉過度恐腸爛及喉舌生瘡方三首

飲酒連日醉不醒方九首

飲酒令難醉方一首

飲酒積熱方二首

斷酒方一十五首

服藥過劑及中毒方一十一首

解諸藥草中毒方二十九首

解諸蛇蠱毒方六首

辨五大毒方一首

解金鐵等毒方八首

惡毒障氣毒風腫毒方四首

尚德按今有法四十首

尚德按二首下疑脫並代茶飲列於下七小字

尚德按二首下疑脫並代茶飲列於下七小字







唐王壽先生外臺秘要方卷三十一

宋朝散大夫守光祿卿直祕閣判登聞鼓院上護軍臣林億等上進

新安後學程行道敬通父訂梓

採藥時節一首

尚德按月千金翼作

千金翼論曰夫藥採取不以時節不知陰乾暴乾雖有藥名終無藥實故不依時採取與朽木不殊徒費

藥多重出

人功卒無裨益其法雖具本經學者尋覽造次難得所以甄別即目可知耳

而列所宜

通草取枝烏喙乾烏頭乾絡石陰乾以上茯苓乾扶神桂心陰白朮暴乾地黃陰天門冬暴麥門冬

參者如人

薯蕷暴甘草暴人參暴石龍芮陰藁本暴龍膽陰杜仲陰牛膝陰細辛陰獨活暴升麻暴柴胡

參一見於

暴榆皮暴藍葉暴當歸陰防風陰芍藥陰桔梗陰秦艽陰前胡陰知母陰枯薑根陰沙參陰狗脊陰茜

見於四月

根王不留行草薢陰菝葜陰白芷陰杜若陰百合陰白斂陰地榆暴以上大黃乾虎掌黃連秦

之類製止

皮猪苓石葦陰紫菀陰紫葛陰狼毒陰鬼白陰天雄陰防己陰烏喙暴烏頭暴甘遂陰牡丹巴

首揭總藥

戟天石南葉貫衆陰羊桃陰黃精陰黃耆以上二並黃芩陰大青陰天門冬暴水萍暴厚朴陰青

取時月於

箱葉陰玄參陰白薇陰艾葉暴羌花陰商陸乾白朮暴麥門冬陰紫菀陰躑躅陰射干陰茵芋陰黃環

則注二月

陰澤蘭陰無莖杜蘅暴藍葉陰王瓜陰寄生陰防葵暴紫草陰芍藥暴苦參暴茵根暴紫參火澤漆

後不必重

白頭翁三月採白鮮以上石南葉鼠尾草以上並四並葛蒲陰卷柏陰白鮮陰澤瀉陰車前五月採石龍芮子

尚德按解

蜀漆陰肉蓯蓉陰荜薢子暴覆盆子乾漆夏半夏暴五加陰杜仲陰茵陳陰莽草陰蕤核葛

翼作斛

根暴丹參暴蛇床子陰葶藶子立夏後羌薢子青柏子陰苘蓉子陰薤花以上六陰石解陰五加皮採並卷柏陰



又按者實  
翼作著實  
下同

陰菌桂陰立水蘇瞿麥立秋取桃仁陰續斷蔞藜子暴以上並白瓜子飛廉陰女青陰地榆暴

大黃乾桔梗暴大棗暴楮實暴秦皮陰桂陰營實陰鬼白陰百合暴牡丹陰防已陰狼毒陰葶藶暴拔

萆暴白芷暴連翹陰苦參暴石龍芮陰狗脊暴白斂暴前胡暴知母暴枯藁暴根暴巴豆暴猪苓陰茯神

蛇含陰茯苓陰虎掌陰薏苡仁天門冬麥門冬陰杜若暴當歸陰者實暴柴胡暴升麻暴獨活

暴細辛陰牛膝陰石斛陰人參暴薯蕷暴甘草暴敗醬暴恒山陰半夏暴雷丸暴牡荊陰漏蘆陰酸棗

陰白朮暴秦光暴龍膽陰巴戟天陰蔞藜子暴黃連暴沙參暴王不留行暴續斷陰貫眾陰乾地黄陰

地膚子陰五味子陰蜀椒陰瞿菌陰鬼箭陰附子上秦椒澤瀉陰牙子暴黃耆陰芍藥暴石南實

八月上松實陰菊花陰者實暴乾薑枳實陰白朮暴楮實暴厚朴陰杜仲暴蔞藜陰山茱萸陰吳茱

黃暴胡梔子暴辛夷暴牡荊陰秦椒菟絲子暴營實陰九月上並麥門冬陰牛膝陰地膚子陰枳實陰

防風暴決明子皂莢陰桂陰菴蘭子陰山茱萸陰五加根陰厚朴陰雲實暴貝母暴以上上菊子陰冬暴

實陰欽冬花陰龍膽陰十一月上並冬葵子菖蒲龍膽忍冬木蘭大戟二月上並上陰上枸杞子冬根春

夏採葉秋桑根白皮時採無柏葉四時各依方陰蒟蒻春夏採葉秋採根莖

論曰凡藥皆須採之有時日陰乾暴乾則有氣力若不依時採之則與凡草不別徒棄功用終無益也學

者當要及時採掇以供所用耳

藥所出州土一首

千金翼論曰按本草所出郡縣皆是古名今之學者卒尋而難曉自聖唐開闢四海無外州縣名目事事

惟新所以須甄明即因土地名號後之學者各易即知其出藥土地凡一百三十三州合五百一十九種

其餘州土皆有不堪進御故不繁錄耳

關內道  
雍州柏子仁華州覆盆子杜蘅苗羊木防已黃蒲枝神柏白皮天門冬麥門冬水蛭







又按一翼  
作巴進翼  
作連進翼

又按杜桂  
翼作杜仲  
通接乳石  
即鍾乳也

嶺南道

益州仁 梓潼 恒山 黃環 鬱金 木蘭 沙糖 梅煎 乾薑 蜀漆 薤白 蒼朮 升麻 羌活 獨活 金牙 馬齒 黃蘗 益州

綿州天 梓潼 恒山 黃環 鬱金 木蘭 沙糖 梅煎 乾薑 蜀漆 薤白 蒼朮 升麻 羌活 獨活 金牙 馬齒 黃蘗 綿州

梓潼 恒山 黃環 鬱金 木蘭 沙糖 梅煎 乾薑 蜀漆 薤白 蒼朮 升麻 羌活 獨活 金牙 馬齒 黃蘗 梓潼

梓潼 恒山 黃環 鬱金 木蘭 沙糖 梅煎 乾薑 蜀漆 薤白 蒼朮 升麻 羌活 獨活 金牙 馬齒 黃蘗 梓潼

梓潼 恒山 黃環 鬱金 木蘭 沙糖 梅煎 乾薑 蜀漆 薤白 蒼朮 升麻 羌活 獨活 金牙 馬齒 黃蘗 梓潼

梓潼 恒山 黃環 鬱金 木蘭 沙糖 梅煎 乾薑 蜀漆 薤白 蒼朮 升麻 羌活 獨活 金牙 馬齒 黃蘗 梓潼

梓潼 恒山 黃環 鬱金 木蘭 沙糖 梅煎 乾薑 蜀漆 薤白 蒼朮 升麻 羌活 獨活 金牙 馬齒 黃蘗 梓潼

梓潼 恒山 黃環 鬱金 木蘭 沙糖 梅煎 乾薑 蜀漆 薤白 蒼朮 升麻 羌活 獨活 金牙 馬齒 黃蘗 梓潼

梓潼 恒山 黃環 鬱金 木蘭 沙糖 梅煎 乾薑 蜀漆 薤白 蒼朮 升麻 羌活 獨活 金牙 馬齒 黃蘗 梓潼

梓潼 恒山 黃環 鬱金 木蘭 沙糖 梅煎 乾薑 蜀漆 薤白 蒼朮 升麻 羌活 獨活 金牙 馬齒 黃蘗 梓潼

梓潼 恒山 黃環 鬱金 木蘭 沙糖 梅煎 乾薑 蜀漆 薤白 蒼朮 升麻 羌活 獨活 金牙 馬齒 黃蘗 梓潼

梓潼 恒山 黃環 鬱金 木蘭 沙糖 梅煎 乾薑 蜀漆 薤白 蒼朮 升麻 羌活 獨活 金牙 馬齒 黃蘗 梓潼

梓潼 恒山 黃環 鬱金 木蘭 沙糖 梅煎 乾薑 蜀漆 薤白 蒼朮 升麻 羌活 獨活 金牙 馬齒 黃蘗 梓潼

梓潼 恒山 黃環 鬱金 木蘭 沙糖 梅煎 乾薑 蜀漆 薤白 蒼朮 升麻 羌活 獨活 金牙 馬齒 黃蘗 梓潼

梓潼 恒山 黃環 鬱金 木蘭 沙糖 梅煎 乾薑 蜀漆 薤白 蒼朮 升麻 羌活 獨活 金牙 馬齒 黃蘗 梓潼

梓潼 恒山 黃環 鬱金 木蘭 沙糖 梅煎 乾薑 蜀漆 薤白 蒼朮 升麻 羌活 獨活 金牙 馬齒 黃蘗 梓潼

梓潼 恒山 黃環 鬱金 木蘭 沙糖 梅煎 乾薑 蜀漆 薤白 蒼朮 升麻 羌活 獨活 金牙 馬齒 黃蘗 梓潼

梓潼 恒山 黃環 鬱金 木蘭 沙糖 梅煎 乾薑 蜀漆 薤白 蒼朮 升麻 羌活 獨活 金牙 馬齒 黃蘗 梓潼

用藥分兩煮湯生熟法則一十六首

論曰既知無物非藥及所出土地復採得時須在貯積以供時用不得虛棄光陰臨時忽遽失其機要使

風燭不救實可悲哉博學者深可思之用為備耳

千金或曰古人用藥至少分兩亦輕差病極多觀君處方非不煩重分兩亦多而差病不及古人者何也

答曰古者日月長遠藥在土中自養經久氣味真實百姓少欲稟氣中和感病輕微易為醫療今時日月

短促藥力輕虛人多巧詐感病厚重難以為醫故病輕藥味須少病重用藥即多此則醫之一隅何足怪

也

又古之醫者自解採取陰乾暴乾皆悉如法用藥必依土地所以療十得九今之醫者但知診脈處方不



尚德按千  
金漱作微  
躁作燥  
尚德按木  
千金作石

尚德按千  
金黃土泥  
破作人破  
破作人破

知採藥時節至於出處土地新陳虛實一皆不悉所以療十不能得愈五六者實繇於此處方者常須加  
意重複用藥藥乃有力若學古人徒自誤耳將來學者須詳熟之  
凡紫石英白石英硃砂雄黃硫黃等皆須光明映澈色理鮮淨者為佳不然令人身體乾躁發熱口乾而  
死

凡草木藥皆須土地堅實氣味濃烈不爾療病不愈

凡狼毒枳實橘皮半夏麻黃吳茱萸皆欲得陳久者良其餘唯須精新也

問曰凡和合湯藥治諸草石蟲獸用水升數消殺之法則云何答曰凡草有根莖枝葉皮骨花實諸蟲有  
毛翅皮甲頭足尾骨之屬有須燒鍊炮炙生熟有定一如後法順方者福逆之者殃或須皮去肉或去皮  
須肉或須根莖或須花實依方鍊治極令淨潔然後升合秤兩勿令參差藥有相生相殺氣力有強有弱  
君臣相理佐使相持若不廣通諸經即不知有奸惡或醫自以加減意不依方分使諸藥草石強弱相  
欺入人腹中不能治病更加鬪爭草石相反使人迷亂力甚刀劍若調和得所雖未能治病猶得利安五  
臟於病無所增劇例曰諸經方用藥所有熬鍊節度皆脚下注之今方不然此篇具條之更不煩別注也  
凡藥治擇熬炮訖然後秤之以充用不得生秤

凡石藥及玉皆碎如米豆以綿裹內湯酒中煮之

凡鍾乳及諸石以玉鍾著水研之三日三夜漂練務令極細乾研則七日七夜

凡銀屑以水銀和成泥

凡礬石以黃土泥團之火燒半日乃熟可用仍不得過之不鍊生入藥使入破心肝

凡朴硝礬石燒令汁盡乃入丸散芒硝朴硝皆絞湯訖乃內汁中更上火兩三沸令烺盡乃服

凡湯中用丹砂雄黃細熟研如粉臨服乃投湯中攪令調和服之

凡湯中用完物皆壁破乾棗梔子之類是也用細核物亦打破山茱萸五味子槌核決明子之類是也細



花子物正爾完用之旋復花菊花地膚子葵子之類是也米麥豆輩亦完用之

凡橘皮吳茱萸椒等入湯不咬咀

凡諸藥子仁皆去尖皮及兩人者湯揉槌去皮仍切之用梔子者去皮用蒲黃者湯成下

凡生麥門冬生薑入湯皆切三搗三絞取汁湯成去滓下之煮五六沸依如升數不可共藥煮一法薄切

用之

凡麥門冬皆微潤抽去心

凡麻黃去節別煮兩三沸掠去沫更益水如本數乃內諸藥煮之不爾令人煩寸斬之小草瞿麥五分斬

之細辛白前三分斬之膏中細切用之

凡牛膝石斛等入湯酒拍碎用之石斛入丸散者先以礪槌極打令碎乃入白不爾搗不熟

通按戴金作膠尚德按責千金作青

凡用桂厚朴杜仲秦皮木蘭皮輩皆削去上虛軟甲錯取裏有味者秤之茯苓猪苓削去黑皮秤牡丹天門冬巴戟天遠志野葛等皆槌破去心紫苑洗去土戟乾乃秤之薤白葱白除責令盡莽草石南茵芋澤蘭剔取葉及嫩莖去大枝鬼白黃連皆除根毛石葦辛夷拭去毛又去心蜀椒去目及開口者用大棗烏梅皆去核用兔箭削取羽皮

尚德按扶字下千金有苓字

凡茯苓藥補藥須白者瀉藥唯赤者

凡菟絲子湯淘汰去土乾漉煖酒漬經一宿漉出暴微白搗之不盡者更以酒漬之三五日乃出暴微乾搗之須更悉盡極易碎

凡甘草厚朴枳實石南茵芋藜蘆皂莢之類皆炙之而枳實去穰藜蘆去頭皂莢去皮子

凡椒雲實微熬令汗出即有勢力

尚德按千金無雲尚德按千金半夏上

凡湯丸散用天雄附子烏頭烏喙側子皆燂灰炮令微拆削去黑皮乃秤之唯薑附湯及膏酒中即生用亦削去皮乃秤之直理破作七八片半夏熟湯浸洗去上滑一云十洗四破乃秤之以入湯若膏酒丸散



有以字刷  
揭為一條

尚德按  
千金作頂

尚德按  
千金作藥  
今作令

尚德按  
千金作微  
尚德按  
千金作藥

尚德按  
千金作令

皆燬灰炮之用

凡巴豆去皮膜熬令紫色杏仁桃仁葶藶胡麻諸有膏脂藥皆熬黃別搗令如膏脂成視之泯泯爾乃以向成散稍稍下白中合研搗令消散乃復都以輕絹篩之泯盡又內白中依法研治數百杵也湯膏中亦有熬者雖有生用者並搗破

凡麥蘖麴末大豆黃卷澤蘭無灰皆微炒乾漆熬令煙斷烏梅入丸散熬之用熟艾者先炒細擘合和諸藥搗之令細散不可歸者內散中和之

凡用諸毛羽齒牙蹄甲龜鼈鮫鯉等甲皮肉骨角筋鹿茸等皆炙之蛇蛻皮微炙

凡用斑蝥諸蟲皆去足翅微熬用桑螵蛸中破炙之牡蠣熬令黃色蠶蜂房微熬之

凡丸散用膠先炙令通體沸起燥乃可搗有不沸處更炙之斷下湯直爾用之勿炙諸湯中用阿膠皆絞湯畢內汁中更上火令烺盡

凡用蜜先以火煎掠沫令色紫黃即丸經久不壞掠之多少隨蜜精麤遂至大稠於丸彌佳

凡丸中用蠟烺之投少蜜中攪調以和藥

凡湯中用飴糠皆湯成下諸湯用酒者皆臨熟下之

又云古秤唯有銖兩而無分名今則以十黍為一銖六銖為一分四分為一兩十六兩為一斤此則神農之秤也吳人以二兩為一兩隋人以三兩為一兩今依四分為一兩為定方家有云等分者皆是丸散隨病輕重所須多少無定銖兩兩三種或五種皆悉分兩同等爾

凡丸散云若干分兩者是品諸藥宜多宜少之分兩非必止於若干之分兩也假今日服三方寸匕須差止是三五兩藥爾

凡散藥有云刀圭者十分方寸匕之一準如梧桐子大也方寸匕者作匕正方一寸抄散取不落為度錢



尚德按以  
小豆千金  
作以二小  
豆

尚德按核  
千金作穢

七者以大錢上全抄之若云半錢七者則是一錢抄一邊爾並用五銖錢也錢五七者今五銖錢邊五字者以抄之亦令不落為度一撮者四刀圭也十撮為一勺十勺為一合以藥升分之者謂藥有虛實輕重不得用斤兩即以升平之藥升方作上徑一寸下徑六分深八分內散勿按抑之正瀾微動令平調耳今人分藥不復用此

凡丸藥有云如細麻者即胡麻也不必扁但令較略大小相稱爾如黍粟亦然以十六黍為一大豆也如大麻子者即今大麻子準三細麻也如胡豆者今之青斑豆也以二大麻子準之如小豆者今赤小豆也粒有大小以三大麻子準之如大豆者以小豆準之如梧桐子者以二大豆準之一方寸之散蜜和得如梧桐子十九為度如彈丸及雞子黃者以十梧子準之

凡方云巴豆若干枚者當先去心皮畢乃秤之以一分準十六枚附子烏頭若干枚者去皮畢以半兩準一枚枳實若干枚者去核畢以一分準二枚橘皮一分準三枚棗有大小以三枚準一兩乾薑一累者以半兩為正本草云以一兩為正

凡方云半夏一升者洗畢秤五兩為正椒一升三兩為正紫葳莢一升五兩為正菟絲子一升九兩為正蒼蘭子一升四兩為正蛇牀子一升三兩半為正地膚子一升四兩為正此其不同也云某子一升者其子各有大小虛實輕重不可通以秤準皆取平分為正

凡方云桂一尺者削去皮重半兩為正甘草一尺者重二兩為正云某草一束者重三兩為正云一把者重二兩為正

凡方云蜜一斤者有七合猪膏一斤者一升二合

凡湯酒膏藥舊方皆云呔咀者謂秤畢搗之如大豆又使吹去細末此於事殊不允當藥有易碎難碎多末少末秤兩則不復均平今皆細切之較略令如呔咀者乃得無末而片粒調和也凡云末之者謂搗篩如法也



凡丸散先細切暴燥乃搗之有各搗者有合搗者並隨方所言其濕潤藥如天門冬乾地黃輩皆先切暴乾獨搗令偏碎更出細擘暴乾若值陰雨可微火烘之小停冷乃搗之

凡濕藥燥皆大耗當先增分兩須得屑乃秤之為正其湯酒不須如此

凡篩丸藥用重絹絹令細於蜜丸易熟若篩散草藥用輕疎絹於酒中服即不泥其石藥亦用細絹篩令如丸藥者凡篩丸散藥畢皆更合於白中以杵搗之數百過視其色理和同為佳

凡煮湯用微火令小沸其水數依方多少大略二十兩藥用水一斗煮取四升以此為率皆絞去滓而後酌量也然則和湯欲生少水而多取汁者為病須快利所以少水而多取汁補湯欲熟多水而少取汁者為病須補益是以多水而少取汁好詳視之不得令水數多少湯熟可用新布兩人以尺不絞去滓澄去逆濁分再服三服者第二第三服以紙覆令蜜勿令洩氣欲服以銅器於熱湯上煖之若於鑊中勿令器中有水氣方云再服三服者要令力勢相及並視人之暴羸病之輕重以為進退增減之不必悉依方說也

### 古今諸家丸方一十八首

廣濟療傳屍骨蒸瘰癧肺痿疰忤鬼氣卒心痛霍亂吐痢時氣鬼魅瘴瘧赤白暴痢瘀血月閉瘰癧丁腫驚癩鬼忤中小兒吐乳大人狐狸等病吃力伽丸方 吃力伽 白朮 光明砂 訶梨勒皮 麝香當門子

香附子 丁子香 沉香 華撥 檀香 青木香 安息香 犀角 二兩 薰陸香 蘇合香 龍腦

各半 右十五味搗篩白蜜和為丸每朝取并花水服如梧子四丸於淨器中研破服之老小一丸以

蠟裹一丸如彈丸緋絹袋盛當心帶之一切邪鬼不敢近千金不傳冷水煖水臨時量之忌五辛生血物以臘月合神前藏之密器中勿令洩藥氣神驗

千金耆婆萬病丸療七種癰塊五種癰病十種注忤七種飛尸十二種蠱毒五種黃病十二時瘧疾十種水病八種大風十二種癰痺並風入頭眼暗膜膜及上氣欬嗽喉中如水雞聲不得卧飲食不作肌膚五



又按千金  
無上字

又按狗字  
下千金有  
牛字

又按千金  
更服三九

又按三千  
金作一

臟滯氣積聚不消擁閉不通心腹脹滿連及胸背鼓脹氣堅結流入四肢或復又心膈氣滿時定時發十  
年二十年不差五種下痢瘡蟲蛇蟲寸白蟲諸蟲上下冷熱久積痰飲令人多睡眠消瘦無力陰入骨髓  
便成滯疾身體氣腫飲食嘔逆腰脚酸疼四肢沉重不能久行久立婦人因產冷入子藏藏中不淨或閉  
塞不通胞中瘀血冷滯流出流不盡時時疼痛為患或因此斷產並小兒赤白下痢及胡臭耳聾鼻塞等病  
服此藥以三九為一劑服藥不過三劑萬病悉除說無窮盡故稱萬病丸以其牛黃為主故一名牛黃丸  
以耆婆良醫故名耆婆丸方 牛黃 麝香 犀角 硃砂 雄黃 羌青 黃連 人參

禹餘糧 大戟 芫花 茯苓 乾薑 桂心 桑白皮 當歸 芎藭 芍藥 甘遂 黃芩 蜀

椒 細辛 巴豆 前胡 桔梗 紫苑 蒲黃 葶藶子 防風 蜈蚣 石蜥蜴 一寸

右三十一味並令精細上牛黃麝香犀角硃砂雄黃禹餘糧巴豆別研餘者合搗篩之以白蜜和更搗

三千杵極熟密封之除破日平旦空腹以酒服三九如梧子微下三五升惡物為良若卒暴病不要待

平旦無問早晚即服以吐利為度若不吐利更加一丸或至三九五丸須吐利為度不得限以丸數病

殫藥少即不利吐若其發遲以熱稀粥一杯發之若吐利不止即以酸飯兩三口止之服藥忌陳臭生

冷酢滑粘食大蒜猪魚雞狗馬驢肉白酒行房七日外始得一日服二日補之得食新米韭菜汁作羹

粥膿飲食之三九頓大良亦不得全飽產婦勿服之吐利以後常須閉口少語於無風處溫牀暖室將

息若旅行卒暴無飲以小便送之若一歲以下小兒有疾者令乳母服兩小豆亦以吐利為度近病及

卒病皆用多積久疾病即少服常取微瀉利為度 崔氏無黃芩桑 白皮桔梗防風

卒病欲死 服三九如小豆 卒得中惡口噤 服二九如小豆和燉水一合

五注鬼刺客忤 服二九如小豆不 男女邪病歌哭腹大如妊身 服二九如小豆日三

瘧鬼病 服小豆三九 蟲毒吐血腹痛如刺 服小豆二九不

瘧病 服小豆三九 諸瘧飲者 服三九如小



又按千金  
日三

又按三十  
金作二

又按千金  
服二九下  
並同

尚德樓平  
金地塘  
獨各七枝  
巴豆五枝

冷瘧 服三九如小豆日三服皆

瘰癧積聚 服二九如小豆日三服皆

上氣嘔逆胸中滿不得卧 服二九不

瘰癧惡寒 服小豆二九不

小便不通 服小豆二九不

耳聾耳鳴 服小豆二九不

癰腫丁癰 服小豆二九不

癰瘡 服小豆二九不

痔瘡 服小豆二九不

癰瘡 服小豆二九不

諸冷瘡積年不差者 服小豆二九不

蜂蟄 服小豆二九不

小兒驚癇 服小豆二九不

小兒乳不消心腹脹滿 服小豆二九不

又大鼻香丸瘰癧注飛尸等萬病皆瘰癧之方

石盡令細辛 桂心 癰肝 藜蘆各二 蜈蚣 蛇蝎 各一 地膽 斑蝥 杏仁 各五 十枝 丹砂 研 雄黃 研 兩 藥石 中 日 芫青 熱 亭長 熱 各七 枝 巴豆 去 皮 熱 右二十三味合搗別搗巴豆杏仁如泥

宿食不消 服小豆二九不

拘急心腹脹滿心痛 服小豆二九不

水病 服小豆二九不

傷寒天行病 服小豆二九不

大便不通 服小豆二九不

鼻衄 服小豆二九不

犯丁腫血出 服小豆二九不

漏瘡有孔 服小豆二九不

癰瘡 服小豆二九不

胸背腰脇腫 服小豆二九不

惡刺 服小豆二九不

蠅蟄 服小豆二九不

婦人諸疾胞衣不下 服小豆二九不

小兒客忤 服小豆二九不

麝香 三 牛黃 真珠 附子 炮 鬼白 莽草 犀角 屑 磐

蜜和更搗三千杵丸如小豆每有病以飲服一丸日再漸至三丸尤妙毒蟲所蟄摩之以知為度若欲



入毒瘡癰疽死喪家及鬼神廟塚墓處以絳囊盛之男左女右肘後繫之又以少許塗人中卧不覺魅  
神驗忌如常法

又小麝香丸主瘡與大麝香丸同方 麝香三雄黃研丹砂研各四分 犀角犀角 梔子仁各二 附子炮 烏頭炮各五枚去皮 巴豆心五十枚去皮熬 蜈蚣蛇頭足各一枚 乾薑 桂心 芍藥各五 莽草

搗一千杵丸如小豆每服三丸至五丸日三一切尸注心痛皆主之忌生血物生葱生菜蘆笋猪肉冷水神驗方有奇

崔氏溫白丸療癰瘰癧等一切病並治之方 紫苑 吳茱萸 菖蒲 柴胡 厚朴 桔梗 皂莢皮去

炙茯苓 桂心 乾薑 黃連 蜀椒汗 巴豆去心 人參各三分 烏頭炮十分 右十五味合搗篩以

白蜜和更搗二千杵丸如梧子大有病服一丸至二丸不知稍增至三丸五丸以知為度主心腹積聚

久癰瘰癧大如盂碗黃疸宿食朝起嘔吐支滿上氣時時腹脹心下堅結上來搶心傍攻兩脇微背連

胸痛無常處繞臍臍痛狀如蟲咬又療十種水病八種痞塞反胃吐逆飲食噎塞五淋九種心痛積年

食不消化或婦人諸疾斷緒不生帶下淋瀝或痰癰連年不差又療一切諸風身體頑痺不知痛癢或

半身不遂或疼痛或眉髮墮落又療七十二種風三十六種遁尸注或癰癧或婦人五邪失心夢與鬼

神交通四肢沉重不能食飲皆昏默默只欲取死終日憂愁情中不樂或恐懼悲啼飲食無味月水不

調真似懷孕連年累月癰瘦困弊遂至於死或歌或哭為鬼所亂莫之知也但服此藥者莫不除愈臣

知方驗便合藥與婦人服之十日出癰瘰癧蟲長二尺五寸三十枚下膿二升黑血一升青黃汁五升

所苦悉除當月有子臣兄墮馬被傷腹內有積血天陰即發戰瘧著牀命在旦夕與藥服下如雞肝黑

血如手者二百餘片白膿二升赤黃水一升其病即除臣知方驗敢不獻上忌生冷酢滑猪雞魚犬牛

馬鵝肉五辛油麵豆糯米陳臭等物

仲景三物備急丸司寇裴秀為散用療心腹諸卒暴百病方 大黃 乾薑 巴豆各一兩去皮心 右

尚德按此方已見第  
十二卷中  
分兩不同  
文亦小異

又按前  
作咳  
又按淋  
下前有  
痔二字

又按前  
升作三  
一升作  
斗二百  
片作百  
冷字下  
有字

丁有羊字



尚德按  
九疑當作  
枵丸

尚德按  
寒論丸如  
雞黃大以  
沸湯數合  
和一丸研  
碎服之  
二服

通按此方  
千金翼必  
取王相暗  
明時合不  
然極意中  
用極意非  
獨此方為  
然又終合  
亦宜準是  
又宜數散  
竭誠不待  
玩忽

藥各須猜新好藥搗篩蜜和更搗一千搗丸如梧子或小豆服三九老小量之為散不及丸也若中惡客忤心腹脹滿卒痛如錐刀刺痛氣急口噤俾尸卒死者以煖水若酒服之或不下捧頭起灌令下咽須臾差如未更與三丸以腹中雷鳴轉即吐下便愈若口已噤亦須折齒灌之令入尤妙神驗忌蘆葶猪肉冷水肥膩

又理中丸療三焦不通嘔吐不食並霍亂吐痢不止者並主之方 人參 乾薑 白朮 甘草 各三兩

右四味搗篩蜜和如梧子空腹以飲汁服十五丸忌桃李雀肉海藻松菜

延年駐車丸主赤白冷熱血痢腹痛者方 黃連 兩六 乾薑 當歸 阿膠 各三兩 右四味搗篩以三年米醋煮膠令消和藥衆手搗丸如梧子每以飲下三十九日再服亦療產婦下痢不止者服之甚驗忌猪

肉冷水粘膩等物

救急五香丸療諸毒疰氣心復脹滿大小便不通鬼疰心痛不可忍方 牛黃 研 犀角 屑各三分 升麻 沉香

薰陸香 當歸 桂心 青木香 麝香 研 雄黃 研 如 鬼箭羽 巴豆 去心皮熱 訶梨勒皮 硃砂 研 檳榔

仁 乾薑 吳茱萸 甘草 炙 豆蔻 各四分 桃仁 去皮熱 附子 炮各五分 右二十一味搗篩蜜和丸如梧子以

煖水服三九至五九如不利更服以利為度此方甚驗人久不傳忌海藻松菜猪肉冷水生葱蘆葶生

血等物

必效玉壺丸主萬病與麝香丸同效方 雄黃 研 硃砂 研 巴豆 去心皮熱 附子 炮去皮 特生礬石 燒半日 藜蘆 各三兩

右六味搗篩蜜和丸如小豆以飲服二丸得利病差小兒黍粟一丸以意量之

又青木香丸療一切氣腹脹滿心痛氣冷食不消方 青木香 檳榔仁 各六分 藥 枳實 炙 訶梨勒皮

分五 桂心 分四 黃芩 分十二 右七味搗篩蜜和丸如梧子飲下十五丸以意增減之常令溲利甚效

又五補七宣者麗正殿脩書學士李公所傳公名子昭字雲卿趙郡人幼志道法以棲名山往來茅嵩山

經三十載云五補七宣丸方 人參 茯苓 地骨皮 乾地黄 牛膝 分等 右五味搗篩蜜和丸如梧



子空腹以酒飲下三十九粒稍增至五十九粒日再此是五補丸服至五日十日及半月日覺氣擁即服七宣丸服經二三日覺氣散還服五補丸若病候未退即稍稍增之常自審以服調適終須五補及七宣丸並須合服之夫人所疾皆因風不宣散即成擁緩熱風若氣不流行即成痙瘳冷氣轉生眾病皆因此由尋其本源都為不閑將理覺虛則補覺風氣擁即利利即腰背更虛且凡是利藥皆急服便透過未能蓄洩諸病凡是補藥皆滯服未見效先覺風氣發動明知宜補必藉兼行故其人授余二法名曰五補七宣所以安七魄鎮五藏堅骨髓養神明久服長生百病日去髮黑行及奔馬

又七宣丸方

大黃

十五

枳實

青木香

柴胡

訶梨勒皮

各五

杏仁

六兩

甘草

四兩

右七味

搗

篩

蜜和丸

如梧子

以酒服

二十九粒稍加至五十九粒病在下空腹服病在上飲後服之以宣利為度增減以意量之若風氣結聚宿食不消兼沙石皮毛在腹中服經七八日乃盡出下似牛涎魚腦等病深痼則須半月或一月專服之不用五補丸若積年腰膝疼痛寒冷如冰石脚氣衝心憤悶將死頭旋暗倒肩背重悶心腹脹滿胸膈閉塞風毒腫氣連及頭面及大小便或利澀脾胃氣不理不能飲食反臥脚轉筋眼掣痛恍惚然眠寢不安等疾以飲服之盡差此藥功效不可盡說如前十數種病則須服七宣丸自外輕病不妨與五補丸兼服循環不輟補養無限不問男女老小並可服餌但須量氣力細察候之加減服之是初生孩者可與三九五九粒稍加之取通利其二方當須經久常服不限春秋久夏朝夕行止勿間藥性甚善禁如常法

近效大

麝香

九

瘰癧

年心痛

尸疰

蠱毒

癰瘡

氣承心

肋下有塊

溫瘴

毒氣

精魅

邪氣

或悲

或哭

蛇蠍

蜂螫

等方

麝香

研

牛黃

研

藜蘆

硃砂

研

芍藥

當歸

茯苓

桔梗

鬼箭羽

金牙

研

烏頭

炮

桂心

等方

麝香

研

牛黃

研

吳茱萸

貫眾

各一

雄黃

一分

乾薑

人參

大蟲骨

各二

蜈蚣

去足

蜥蜴

半枚

巴豆

二十枚

去心

等方

吳茱萸

研

牛黃

右二十一味搗篩蜜和丸如梧桐子飲下三丸如未下以熱飲投之即利三行後以酢飯止之即定然後煮飯葱雜食之忌冷水豬肉如蛇蠍蜂螫取一丸研和塗之即差精魅狐狸之屬拋磚瓦或如兵馬



行夜發者是鬼魅無早晚每日服二丸只三兩日即定仍每日燒一丸熏身體衣服無忌以三五丸用緋絹袋子盛帶左臂上辟大蟲毒蛇精魅鬼氣等病

又犀角丸療癰腫腸癰乳癰發背一切毒熱腫服之腫膿化為水神方 犀角二角十分 川升麻 黃芩 防

風 人參 當歸 黃耆 乾薑一作乾薑 藜蘆一作藜蘆 黃連 甘草 梔子各四分 大黃五分 巴豆去心皮熬

右十四味如法搗篩蜜和更搗三千杵丸如梧子以飲服三丸至五丸以利為度或不利投以熱飲如

利以冷漿水粥止之未差每日服一丸以意量之腫消散為度若下黃水或腫輕皮皺色變即是消候

忌如藥法效驗不可論之

又黃連丸療痢無問冷熱並主之方 黃連二兩 茯苓二兩 阿膠一兩 右三味搗篩以水消膠和眾手丸暴乾

有痢空腹以飲下十五丸日再以差止甚效

又加減麻仁丸療積年患氣不能食飲兼食不消化風氣冷氣熱氣衝上瘧瘕氣並乳石氣發動並療之

服經三四日自覺有效方 蜀大黃四兩 人參 大麻仁各二兩 訶梨勒皮四兩 右四味搗篩依法以蜜

和丸每服十丸二十丸增減以意量之以溲利病除亦不損人雍州王長史常服三十餘年八十歲萬

病皆無百無所忌補理腰脚服經七八日腰腎先冷者即下膿水腰脚輕健以酒飲下之並得

又三黃丸療五勞七傷消渴不生肌肉婦人帶下手足寒熱主一切熱方 春三月用 黃芩四兩 大黃二兩

黃連四兩 夏三月用 黃芩三兩 大黃二兩 黃連四兩 秋三月用 黃芩六兩 大黃二兩 黃連二兩

黃芩六兩 大黃二兩 黃連三兩 右三味隨時月搗篩蜜和丸如梧子日服七丸諸病悉除

古今諸家散方六首

千金小牙散療南方瘴癘疫氣脚弱風邪鬼注方 金牙五分 牛黃一分 天雄 草薢 黃芩 蜀椒

汗由跋 雄黃研 硃砂研 烏頭 桂心 莽草炙 麝香研 各姜棗 細辛 犀角屑 乾薑各三 蜈蚣一

者灸 黃連分四 右十九味治下篩為散合牛黃麝香搗三十杵以溫酒服五錢七日三夜二以知為

通按此方千金製無由致有虎杖分兩亦尚德按差

尚德按此方已見第十一卷中分兩不同



製千金要  
作女藥

通按今本  
千金翼  
雪方中無  
石金用一  
斤丁香四  
兩升香年  
兩餘同  
尚德按本  
金翼今本  
無寒水石  
石膏一味  
確石安得  
成霜膏藥  
此方後注  
則蓋製德  
有四石今  
本脫之耳  
通按此方  
應香雖無  
分兩當與  
確砂膏等  
可也

度以絳袋盛男左女右帶一方寸匕省病問者不避夜行塗鼻人中辟鬼惡毒氣晨昏霧露亦塗之佳  
崔氏五香散療疰忤邪氣或熱或寒時氣在骨節間似差似劇兼主百病方 沉香 丁香 麝香 薰

陸香 鬼箭羽 當歸 豆蔻仁各四分 牛黃 鬼白 橘皮 金牙各三分 犀角屑 羚羊角屑 大黃各六分

升麻 桔梗 桃仁去皮尖 光明砂研 安息香各二分 右十九味搗篩為散以湯飲酒隨病服一方寸匕

日再服病差即停亦可蜜丸如梧子服十九

又備急散療卒中惡心痛脹滿欲吐短氣方 大黃二兩 桂心四分 巴豆一分 豆一分 皮一分 研 右三味搗篩為散取一錢

匕以湯七合和服當吐下即愈甚妙

紫雪散療脚氣毒遍內外煩熱口中生瘡狂易叫走及解諸石草藥毒發邪熱卒黃等瘡疫毒癘卒死溫

瘧五尸五注心腹諸疾緩刺切痛蠱毒鬼魅野道熱毒小兒驚癇百病方 尚德按此方已見第十八

黃金一百兩 寒水石 石膏各三斤 一玄參 一羚羊角屑 犀角屑 沉香 青木香各五兩 丁香 甘草八兩

右十味切以水三斗煮取一斗去滓取硝石四升芒硝亦可用朴硝十斤投汁中微火煎以柳木篋攪

勿住手候欲凝入盆中內硃砂三兩麝香一兩急攪即成霜雪紫色以水和一二分服之以意加減一

劑十年用之神妙脚氣乳石天行熱病等服之若神 千金翼有磁石三斤滑石一斤升麻一斤

仙人鍊絳雪療一切病肺氣積聚欬逆嘔吐膿血丹石毒發天行時氣一切熱病諸黃疸等心風昏亂心

怯健忘四肢煩熱頭痛眼赤大小便不通煩悶不安骨節疼痛赤白痢血痢熱毒痢宿食不消化心腹脹

滿出氣不得下一切諸毒藥脚氣等飲酒多醉困久病不差孩子驚癇等以上和水服之產後一切諸病

墮胎和酒服之方 朴硝十斤 升麻三斤 大青 桑白皮 槐花各二斤 犀角屑 羚羊角屑 蘇方木六兩 竹葉口

訶梨勒 山梔子三斤 檳榔仁二十斤 硃砂半斤 右十三味以水二斗漬一宿煎去一斗去滓入鍋內

朴硝鍊煉攪勿住手候欲凝出於盆中攪入硃砂麝香訶雪成收於磁器中密封有疾量取之和水服

之以利病除身輕目明四肢調適療一切病神驗老小量之上見分兩



近效百瘡湯歌主除風下氣強腰脚明耳目降痰飲理榮衛永不染時氣諸風疾方 黃耆 芎藭

茯苓 五味子 防風 澤瀉 獨活 玄參 人參 牛膝各六兩 麥門冬各八兩 桂心 甘草

草三兩 丹參五兩 右十五味切如大豆分作二十四貼貼著牛薑一兩切杏仁十四枚去尖碎以水三

升煮一貼取一升去滓澄清取九合頓服每日一貼晚間以氣下心胸空妙十服以後身力不可當常

須護惜將養之以飲食補之每年春夏秋冬服一劑勝服腎氣丸二十劑永不患風氣先有諸病自然

除差張中丞自服以來神效不可言以為乳石力不可比今服不闕效驗妙方云腎溫湯也

古今諸家膏方四首

廣濟神明膏主諸風頑痺筋脈不利癰癬諸瘡瘻方 前胡 白朮 白芷 芎藭並切 椒去目 吳茱萸各一升

附子三十枚 當歸 細辛 桂心各二兩 右十味以苦酒漬一宿令浥浥然以成鍊猪膏一斗微火煎

十沸以采九上九下候附子白芷色黃絞去滓膏成病在外摩之在內以酒服棗核大疥癬等瘡皆瘥

之並去諸風病亦摩折傷被打等服之亦大瘥諸病

崔氏陳元膏會稽太守思翊昧死再拜上書 皇帝陛下思幸得典郡視事六年處地下濕身病苦痺飲

食衰少醫瘡不差命在旦暮蒼梧道士陳元賣藥於市思取藥摩之日至再十五日平得思男嘗隨馬苦

為腰痛天陰雨轉發思取元膏摩之復愈思妻年四十五苦心腹積聚得病三年思復從元取膏摩之六

日下宿食即愈思銓下郭少苦頭眩思取膏摩三日鼻中下水二升所病即愈思知元藥驗謹取元本方

奉上 當歸三兩一方 生地黃二斤搗 附子三兩 細辛二兩 桂心一兩 天雄三兩 乾薑二兩 丹砂一兩 芎藭二兩 雄

黃二兩 烏頭二兩 苦酒三升 白芷二兩 松脂一斤 不中水猪脂十斤 右十五味咬咀以地黃汁苦酒漬一宿

取猪脂內諸藥微火煎之令十五沸膏成去滓內硃砂等末熟攪勿令婦人雞犬孝子惡疾不具足人

小兒等見有人若胸脇背痛服之七日所下狀如雞子汁者二升即愈又有人苦脇下積聚如杯摩藥

十五日即愈又有人苦脇傍氣如手藥摩之去爪中黃壤者升許即愈有人患腹切痛時引背痛數年

通按此方  
千金無附  
子雞黃苦  
酒分兩不  
同與此亦  
異  
尚按按若  
疑當作苦  
下並同此

疑當作又  
又按千金  
翼去字下  
有如字皆  
作脇

通按生乳  
一作牛乳  
無近地無  
食糖之牛  
疑誤

以膏摩之下如蟲者三十枚即愈又有婦人若月經內塞無子數年膏摩少腹並服如杏子一枚十日  
下崩血二升即愈其年便有子又療風搔腫起累累如大豆以膏摩之五日即愈老少患脚膝冷痛摩  
之五日便愈又有人若頭項痛寒熱瘰癧瘰癧及病上即愈又有人患面目黎黑消瘦是心腹中病服  
藥下如酒糟者一升餘即愈內外諸風及腹中積聚可服之百病無不愈所療人無數不可悉記

又烏膏療一切瘡引膿生肌兼殺瘡中蟲方 烏麻油升一黃丹上好者二蠟一兩餘淨濾黃陸香乳頭者一兩末松脂  
並大升兩 右五味緩火煎油三分減一下鐺待冷乃內黃丹更上煎之又三分減一又停待冷次

內薰陸香末上火煎候銷盡又內蠟及松脂膏稍稠即點於鐵上試斟酌硬軟適中乃罷先問所患  
瘡如熱即除薰陸及松脂瘡如久不差此涉於冷即依方合其貼杖瘡者油若一升地黃汁半合和煎

黃丹二大兩蠟一小兩餘準上法此膏不須硬也

近效蓮子草膏療一切風耳聾眼闇生髮變白堅齒延年本是婆羅門方 蓮子草汁升三生巨勝油 生

乳各一升不食糖者甘草兩大右四味和於鍋中煎之緩火熬令魚眼沸數攪之勿住手看上沫盡清澄濾

不津埒器中貯之云本方有青蓮蕊六分龍腦花三分鬱金香二分並末先煎諸藥三分減一次下汁

及油等膏成每欲點即仰臥垂頭牀下一孔中各點如小豆許久乃起有唾唾却勿咽之起訖即噉少

熱湯飲點經一年白髮盡黑禿處並出韓庶子處得每用驗

古今諸家皆煎方六首

廣濟阿魏藥煎方 阿魏分四豆蔻仁七顆生薑分十二人參 甘草各八鼈甲分十二藕汁分二訶梨勒七枚牛

膝斤半白蜜升一地黃汁升二右十一味下地黃等汁煎次下藥末微火煎攪勿住攪候如餲於不津器盛

每取一匙酒和服之

又鹿角膠煎療五勞七傷四肢沉重百事不任怯怯無力昏昏欲睡身無潤澤腰疼頑痺脚弱不便不能  
久之胸脇脹滿腹中雷鳴春夏手足煩熱秋冬腰膝冷疼心悸健忘腎氣不理五藏風虛並悉療之方



鹿角膠二斤 碎作四分 紫蘇子二升 以酒 生地黄一斤 生薑汁 黃牛酥升一 白蜜斤三 右六味先

煎地黃汁蘇子汁生薑汁等二十餘沸次下酥蜜又煎三五沸次以蜜並膠末下之攪令相得膠消盡

煎即成矣以器盛之空腹以酒調二合服之日再此藥補五臟益心力實骨髓生肌肉理風補虛耳聰

目明腰脚甚效驗一兩劑便拔覽十倍常時忘羊血

又主冷氣並氣力温中下氣蘇煎方 剉了蒜仁牛乳五升 牛膝斤六 右三味以蒜內牛乳中煎之候蒜

消盡攪勿住手下牛膝末煎成於器中貯之食前以酒和兩匙服忘羊血

又地黃煎主婦人丈夫血氣勞費熱日漸瘦悴方 生地黄汁二升 甘草三兩 豉心升一 葱白升一 牛酥斤三 藕

汁仁白蜜升一 右七味以小便六升煮葱豉等取二升絞去滓次下地黃藕汁更煎取三五沸下酥蜜

攪勿住手候似稀餚以器貯之每服一匙漸至三匙成煎桑枝熬煎湯調和服之尤妙桃仁湯亦良

小品單地黃煎主補虛除熱散乳石癰疽瘡癰等熱方 生地黄隨多少取汁於銅鉢中重湯上煎勿蓋

釜令氣得世煎去半更以新布濾絞去麤滓穢又煎令如餚成矣此用地黃須肥大味濃者作煎甘美

東南地黃堅細味薄作煎鹹不美

近效地黃煎療肺氣欬補心肺令髮髮不白方 生地黄汁仁麥門冬汁 生薑汁五升 紫苑 貝母

款冬花 甘草炙各三兩 右七味切以水七升煮取三大升去滓却入鍋中下地黃汁麥門冬薑汁等三

十沸下蜜一升煎如餚成矣盛不津器中冷含如棗許增加量之一方有人參三兩

古今諸家酒一十二首並代茶飲

千金天門冬酒療五藏六腑大風洞泄虛弱五勞七傷癰結滯氣冷熱諸風癰惡疾耳聾頭風四肢拘攣

蝦退歷節風萬病皆主之久服延年輕身齒落更生髮 天門冬與百部細長而味甘雨頭 右一

味橘取汁一斗漬麴二升以糯米二斗候麴發準家醞法釀之春夏極冷下飯秋冬稍温如人肌下飯

酒熟取清飲一盞常令酒氣相接勿至醉吐慎生冷酢滑雞猪魚蒜特忌鯉魚亦忌油膩此是一斗法

尚德按  
字下千金  
有白更黑  
方四字

又按千金  
翼作流洗  
字下有去  
字皮字下  
有就流去  
三字

尚德按千  
金獎神效  
麥苗芽  
麥各二兩  
壯劑子作  
參丹參半  
除各三兩

餘一石二石亦準此以為大率服藥酒十日覺身體隱癢大癢二十日更大癢三十日乃漸止此是風  
氣出去故也四十日即覺身心朗然大快似有所得五十日更覺大快當風坐卧覺風不著人身中諸  
風悉盡用米法先淨淘暴炕令乾臨飲用時更別取天門冬汁漬米乾脫於餘汁拌飯甚宜密封取天  
門冬汁法淨洗心皮水寸切搗押各三四遍令滓乾如草乃止此酒初熟味酸仍作臭泔腥氣但依式  
服之久停則香美餘酒皆不及也封四七日佳凡八九月即少少合至十月多合擬到來年五月三十  
日以來相續服之春三月亦得合入四月不得合服酒若得散服得力倍速散服如左 天門冬去心  
及皮暴乾搗篩以上件酒服方寸匕日三加至三七久服長生凡酒亦得服

又大金牙酒療瘡癰毒氣中人風冷濕痺口喝面戾半身不隨手足拘攣歷節腫痛甚者少腹不仁名曰  
脚氣無所不療方 金牙燒 白朮 附子 獬子 天雄 茯苓 伏神 當歸 防風 芎藭 黃

耆 薯蕷 細辛 桂心 茵芋 地骨皮 五加皮 杜仲 草薢 狗脊 姜槌 白芷 厚朴

枳實 橘梗 黃芩 遠志法蔓荊子 各三人參獨活 石南二磁石 丹參 牛膝各五 薤白

仁升 麥門冬去心 生石斛生地黃切 兩二 薤白兩 右三十九味並切用絹袋盛以酒八斗漬七日溫

服一合日四五夜一石藥細研如粉別絹袋盛共藥同浸藥力安和主治極多凡是風虛四體小覺有  
風病者皆須將服無不治者服者一依方合之不得輒信誣人大言浪有加減忌如常法

又鍾乳酒療虛損通順血脈極補益下氣方 鍾乳五兩 附子三兩 石斛五兩 甘菊花 茯苓五兩 右五味

剉以生絹袋盛用酒三斗漬經五日每服二合日再稍加至一升

千金翼五精酒主萬病髮白反黑齒落更生方 黃精四兩 天門冬五斤 松葉六斤 白朮四斤 枸杞五斤 右五

味皆生者內釜中以水三石煮之一日去滓取汁漬麴如家釀法酒熟取清任性飲之長手補養忌鯉

魚桃李雀肉等

又白朮酒方 白朮二十斤 右一味咬咀以東流水兩石五斗於不津器中漬之二十日去滓內汁於大



尚德按干  
金翼少作  
石半作二  
熱作熱

盆中夜候流星過時抄己姓名置盆中如是五夜汁當變如血取以清麴如家醢法造酒熟取清任性飲之十日萬病除百日白髮反黑齒落更生面有光澤久服長年忌桃李雀肉等此酒至誠有靈風病服之百神衛人

又枸杞酒方 枸杞斤一百 右一味切以東流水四石煮之一日一夜去滓令得一石汁漬麴釀之如家

醢法酒熟取清置不津器中取乾地黄桂心乾薑商陸澤瀉蜀椒末各一升六味以絹袋盛內酒中漬

密封口埋入地三尺堅牢覆上二十日沐浴整衣冠向仙人拜訖開之其酒當赤如金色平旦空腹服

一盞半升為度十日萬病皆愈二十日癰疽皆滅惡疾人以一升水和半升酒分為五服服之即愈若

欲食少者取河中清白石如棗杏仁大者半升以水三升煮一沸以酒半合置中須臾即熱可食也

崔氏蒼耳酒療大風惡疾及一切諸風乃至骨髓中毒風令人充悅方 蒼耳和莖葉花實取牛膝根升一

松葉北商陸根色青鼠粘根斗 右五物皆剉訖量之以水兩石五斗煮取六斗汁如釜小可分煮

之即分三斗汁將浸麴一斗二升高量其麴加於常法五分為藥力費麴故也餘三斗汁留將拌饋料

糯米一石二斗分作五酸淨淘乾漉以上並大斗第一酸一日炊四斗米取藥汁九升拌饋熟細切生

地黃三斗和米下之第二酸三日炊三斗米取藥汁七升拌饋熟與杏仁一斗去皮尖碎和搗如泥下

之第三酸五日炊二斗米取藥汁六升半拌饋熟取木麻子一斗搗碎和下之第四酸七日炊二斗米

取藥汁四升半拌饋熟取胡麻一斗搗碎和下之第五酸九日炊一斗米取藥汁三升拌饋下之 右

以前五酸法須候米消盡即炊酸之末必要須隔日其酒如米少味薄更炊一二斗米下之使味足然

後去糟取清依常法飲半升不能者可量性多少常使有酒氣逼夜飲最是所宜此酒縱非風疾飲之

補養益精神令人充健

又烏麻地黃酒療風虛補不足除百病已試大效方 六月六日麴四升王斯油麻六斗五升出口州赤

麻皆之以罷去皮乾暴脫烏麻法以冷水浸經一生地黃四斗以煮湯洗待水氣盡便切之更取生地

宿枯之覆筒箕中漉水令盡春之即皮自脫去耳黃一石以水一石和煮粗布絞去滓即取汁

六斗又以麻子生薑內蒸丹參 生石斛 牛膝 杜仲 萆薢 生薑各二人參八 右七味

切以生絹袋盛同內煎熟地黃汁中浸之 令香取無灰重醞酒二斗八升三度淋豆豉一熬三淋淋訖並去豆總計十二度淋豆豉取淋酒別器中

盛然後更寫麴汁等物及諸藥並出在大瓮中以物閉頭及更將此酒先重蒸瓮着冷後還內麴汁及

藥等安在瓮中其日即用八斗精糯米炊作飯如常釀酒法釀酒即以淋豆酒投在瓮中封閉經一兩

宿着米消盡又炊四斗糯米飯釀之此後更封閉經七日其酒即熟任性飲多少量之不限時候常微

微覺身潤夜中稍加少許或汗出佳避風及忌房室特禁毛桃芥生菜熱麴並酢蒜牛肉冷物醞初酒

法待此酒熟即將此更重醞 右麴依常家用法每一斗麴用熟水一斗一升浸炊酒飯即量熟湯

多少用沾飯如凡釀酒法更不得加生水每一斗米酒為佳釀重醞酒法待此酒熟即將酒二斗八升

淋豆 右每一斗麴以熟水一斗浸其酒米每一斗饋料以四斗清酒淋其饋然後炊飯使熟更不得

加水其所洗甑洗手盆瓮等皆須用此酒還投釀瓮中釀藥酒法右欲和藥酒時先置五斗許藥在瓮

底然後加五斗許飯每次如此斟酌至半即內藥袋其藥袋上亦使藥飯相參以至於盡然始閉封

封閉藥酒法 右封閉瓮頭用紙七重布一重其釀酒室唯造酒得入自外貓犬婦人不得輒入室中

又枸杞酒療五內邪氣消渴風濕下胸脇氣頭風本方作痛堅筋骨彊陰利大小便填骨髓長肌肉破除結氣

五勞七傷去胃中宿食利耳目動血吐血風證補中逐水破積瘀膿血石淋長髮傷寒瘴癘毒氣煩燥滿

悶虛勞喘吸逐熱破血及腳氣腫痺悉主之方 糯米一石黍麴計常釀酒米一石用麴一斗 枸杞根十

斤剉去赤皮半寸剉之以水生地黃細切和米炊之秋麻子三十湯林取汁香豉二斗以麴充 右四

味地黃和米蒸之三物藥汁總合得五斗地黃濕即四斗分半漬米饋半及麴和釀飯即總和一酸密

蓋瓮口經二七日壓取封泥復經七月初一度一釀用麻子二斗多即恐令人頭痛服酒忌生冷酢滑

雞魚翅蒜油膩白酒房室等服訖一二七日將息



又地黃酒療虛羸令人充悅益氣力輕身明目方蘇州高長中服用效生地黃一石二斗搗杏仁一斗去大皮兩

大麻子一斗熬糯米一石麴一斗五升淨右五味先以地黃汁四斗清麴待發炊米二斗作飯冷

暖如人肌服麴汁中和之候飯消更炊米一斗酸之如前法又取杏仁麻子末各一升二合半和飯攪

之酸麴汁中待飯消還炊米一斗杏仁麻子末各一升二合半一依前法酸之如此凡八酸訖待酒沸

定封泥二七日取清溫服一升漸加至二升日再服之令人頓能食久服去萬病婦人服之更佳令人

有子

近效五加酒方 五加根五斗到六月六日麴末三黍米一石糯米亦得右三味以水五斗共五加同下於大

釜中以木度糴淺與水平赴之即更添水一石五斗並前計兩石即下火煎旋旋急火取藥汁減下至

木剋處即得以火盆安淨篋筐中安淨布單兼漉漉著筐中其汁在盆中唯有五斗且別盛密封蓋之

又重取所漉者五加泮以水煮之如別有五加添和同煮更佳取此汁用泚米拌飯炊之如常炊法用

前五加濃汁清麴且炊米五斗釀之餘五斗分為兩酸如常造酒法酒熟壓漉密封頭每服一盞煖飲

之漸加勿令醉又逐忘十兩末之下釀中益妙玄參及蛇皮肉亦得其糟與已下食之尤佳

又代茶新飲方 黃耆通草各二茯苓 乾薑 乾葛各一桑根白皮鼠粘根三斤濕生乾地黃

枸杞根洗忍冬十二月取枝葉薏苡仁各十茯苓各八麥門冬法姜糖兩右十四味並揀擇取州

土堅實上者刮消如法然後秤大斤兩各別搗以馬尾羅篩之槽令勻調重篩務令相入不令偏並

別取黃白楮皮白皮根相兼細切煮取濃汁和漉令硬軟得所更於臼中搗別作一竹椀子團潤二寸

半厚二分以下臨時斟量大小厚薄作之此亦無定衆手依摸揜成餅子中心穿孔日暴乾百餘餅為

一穿即以葛蔓為繩貫之竹作篾亦得掛之通風陰處妙若須煮用以炭火上炙令香熟勿令焦白中

搗末任隨時取足煎以代茶大都濃薄量之著少鹽煮之頻揚之即滑美著鹽橘皮單撥亦佳除風破

氣理丹石補腰脚聰耳明目堅肌長肉暖筋骨通腠理頭腦悶悶眼睛疼痛心虛脚弱不能行步其效

尚德按肘  
後三味各  
半加

又方 大黃 芍藥 芒硝 各一斤  
右三味末之以蜜三斤於銅器中湯上煎可丸服如梧子十九日再





即藥未盡一二日後更進一劑

又方 都淋藤十二兩此藥崇南有土人識人呼為三 右一味以水一升酒二升和煮取二升分三

服服訖藥毒逐大小便出十日慎毒食不差更服以差為度時後云

又療腹內諸毒方 都淋藤 黃藤各二虎口長 右二味以酒三升合甕中密封以糖火圍四邊燒令

三沸待冷出之溫常服令有酒色無禁忌若不獲已欲食俚人食者先取甘草一寸炙令熟嚼咽汁若

食者毒藥即吐便是藥也依前法療之若經含甘草而不吐非也宜常收甘草十數片隨身帶之自防

也嶺南將熟食米及生食甘蔗芭蕉之屬自更於火上炮炙燒食之永無慮也若被席上散藥卧著因

汁入肉最難主療可常自將淨席隨身及匙筋甘草解毒藥行甚妙時後無

張文仲白黍不可合 黍米不可合 白蜜不可合 蒜不可合 蒜首不可合 病人不可食 胡荽不可食 荳蔻不可食 五

月勿食十月勿食三月三日四月八日勿食二月勿食四月勿食胡荽按仲景方云正月勿食生葱二

食馬肝中毒方 取牡鼠矢二七枚兩頭尖者是水和研飲之仲景

又食諸六畜鳥獸肝中毒方 取髮煎之長半寸投土作溲沾二升合和所到髮飲之須更髮皆實所食

肝出也謹按髮誤食之令人成髮癰為病不可療今和髮土飲之豈得有此理否可詳審之別有方法

又方 服頭垢一錢已立差仲景云

又方 清水投鼓絞取汁飲數升差止

又凡物肝臟自不可輕啖自死者彌勿食之

諸心皆勿食之為神識所舍使人來生獲報對又食生肝中毒方 服附子末方寸七日三須以生薑湯

尚德按港 肝後作癰 又按汁疑 當作汗 尚德按港 當二字疑 當細書 通按誤食 髮難或食 此和土藥 亦或取其 吐下立方 者有必定 見凡肉經 有故無確 之文謂直 此方則可 謂無是理 則過矣 尚德按港 字上疑脫



通按本品  
無甘豆從  
解毒方中  
有甘草大  
豆湯或是  
也  
尚從按繪  
肝歌作胎  
又按自要  
略作目

魚鱗亦有毒察其食之幾死  
皆若夫鱸者性多毒熟煮及可食之或云是水良所

椒不可飲熱飲熱殺人



千金論曰凡人跌涉山川不識水土人畜飲吸誤中其毒素不知方多遭其斃豈非枉橫耶然而大聖久

又療食菜中毒發狂煩悶吐下欲死方 取雞毛燒末以飲服方寸匕差

千金論曰凡人跌涉山川不識水土人畜飲吸誤中其毒素不知方多遭其斃豈非枉橫耶然而大聖久

解一切食中毒方三首

千金論曰凡人跌涉山川不識水土人畜飲吸誤中其毒素不知方多遭其斃豈非枉橫耶然而大聖久

設其法以救活之正為貪生嗜樂忽而不學一朝遭遇便自甘心終不識其所以今述神農黃帝解毒方

法好事者可少留意焉

又論曰甘草解百藥毒此實如湯沃雪有同神妙有人中烏頭巴豆毒甘草入腹即定中藥蘆毒葱湯下

咽便愈中野葛毒土漿飲訖即止如此之事其驗如反諸掌要使人皆知之然人皆不肯學誠可歎息方

稱大豆汁解百藥毒臣試之大懸絕不及甘草又能加之為甘豆湯其驗尤奇有人服玉壺丸吐嘔不已

以百藥與之不止藍汁入口即定如此之事皆須知之此即成規更不須試練也解毒方中條例極多若

不指出一二學者不可卒知餘方例爾

又療諸食中毒方 飲黃龍湯尚德按此黃龍湯蓋人中黃及犀角汁百無不治也若飲馬尿亦良

又療食飲中毒方 苦參三右一味切以酒二升半煮取一升頓服之即愈

古今保驗療諸食毒方 取桑黃心破作一斷著釜中令水出三寸煮取二斗漉澄清微火煎得五升宿

不食服之日三合則吐痰未差更作贏者減之

酒醉過度及腸爛及喉古生瘡方三首

千金療卒大醉惡腸爛方 作湯著大器中漬之冷復易之酒自消夏月亦用之佳肘後同

又方 絞茅根汁飲二升

又療連月飲酒喉咽爛舌上生瘡方 大麻子升黃芩二兩尚德按本方作黃

外臺必要 卷三十一 十五

尚德按千金全飲三升通按勞苦千金作苦茶肘後吐水煎亦得

尚德按此  
肘後作是

通傳經書  
會稽也  
非水中  
此字疑誤

尚德按千  
金云  
令人不解  
方下二  
並同  
尚德按  
字上十  
有花字  
尚德按  
全用  
尚德按  
千金作

丸含之

飲酒連日醉不醒方九首

肘後療飲酒連日醉不醒方 薑菁菜並少米熟煮去滓冷之內雞子三枚或七枚調勻飲之二三升無

雞子亦可單飲之

又方 取水水半中螺蚌若螺蚌輩以著葱豉椒薑煮如常食法飲汁數升即解尚德按今肘後無此方李時珍本草田竈下引肘後云用

又方 生薑水半蒜水半汁及薑蒜餅和絞汁飲之無濕者乾薑煎服注乾薑煎服之亦佳

又方 粳米一升水五升煮使極爛漉去滓飲之尤良

千金療酒醉不醒方 葛根汁飲一二升無多少取醒止

又方 小豆葉陰乾一百日末服之日方寸匕良

又方 五月五日取井中倒生草陰乾末酒服方寸匕佳

又病酒方 取豉葱各一升以水四升煮取二升飲之差止

飲酒令難醒方一首

千金飲酒令無酒氣方 乾薑青根二七枚三遍煮乾末之取兩錢匕飲酒後水服之

飲酒積熱方二首

肘後飲酒積熱遂食黃精方 雞子七枚苦酒漬之器中密封內井底一宿出當軟取吞之二三枚漸至

盡驗

千金治飲酒房勞虛受熱積日不食四體中虛熱飲酒不已入百脈心氣虛令人錯謬失常方 酸棗仁

升人參 白薇 枳實 知母 桔梗 芍藥 二茯苓 甘草 生地 黃兩 右十味切以

升人參 白薇 枳實 知母 桔梗 芍藥 二茯苓 甘草 生地 黃兩 右十味切以

升人參 白薇 枳實 知母 桔梗 芍藥 二茯苓 甘草 生地 黃兩 右十味切以

升人參 白薇 枳實 知母 桔梗 芍藥 二茯苓 甘草 生地 黃兩 右十味切以



水一斗煮取三升分三服

斷酒方一十五首

千金斷酒方 酒七升著瓶中熟硫砂半兩著酒中急塞瓶口安猪圈中任猪啄動經七日取盡飲之永斷

又方 臘月鼠頭灰柳花等分黃昏時酒服一杯

又方 正月一日酒五升淋碓頭搗一下取飲

又方 故穗中葉子七枚燒作灰黃昏時煖取一杯酒咒言與病狂人飲勿令知之後不喜飲酒

又方 白猪乳汁一升飲之永不用酒

又方 刮馬汗和酒與飲之終身不飲酒

又方 大蟲屎中骨燒末和酒與飲

又方 鸛鷺矢灰水服方寸匕永斷

又方 故紡車絇燒灰和酒與飲之

又方 驢駒衣燒灰酒服之

又方 自死蟬蟾乾搗末和酒與飲永世聞酒名即嘔吐神驗

又方 酒客吐中肉七枚陰乾燒灰服之

又方 酒漬汗鞋者一宿且空腹與飲即吐不喜見酒

又方 白狗乳汁酒服之

又方 臘月馬腦酒服之

服藥過劑及中毒方一十一首

前後服藥過劑及中毒多煩悶欲死方

刮東壁土少少以水一二升和飲之良

通接腦前  
衣是驢肥

尚從按前  
疑當作肘

又方 水和胡粉稍飲之

又方 青糲米取其瀝汁五升飲之

又方 搗裏荷取汁飲一二升冬月用根夏月用莖葉

又方 屋雷下作坎方二尺深三尺以水七升灌坎中攪揚之令沫出取沫一升飲之未解更作

又方 搗藍青絞汁數升飲之無藍以青布水洗飲之

又方 燒屋角水服一方寸匕

備急服藥失度腹中苦煩方 飲生葛汁良或乾葛煎湯服之附後

又方 雞子黃三枚吞之良又雞子清飲之又服搗膏良

又方 服諸石藥過劑者白鴨矢水和服之差附後

又方 大黃三兩芒硝二兩以水五升煮取三升分三服得下便愈附後用地黃汁五升煮不用水

解諸藥草中毒二十九首

肘後療食野葛已死者方 以物開口取雞子二枚和以灌之須臾吐野葛出

又方 取生鴨就口斷鴨頭以血灌口中入咽則活若口不開取大竹筒以一頭注其胸膈取冷水注筒

中數易注之須臾口開則可與藥若甚者兩腕及臍各筒注之甚佳

又方 飲甘草汁但唯多更善

又鉤吻與食芹相似而其所生之地傍無他草莖有毛誤食之殺人方 薺芫八兩以水六升煮取

三升服之

又此多生離丹水濱邊絕似茶人識之無敢食但不知之必是鉤吻按本草鉤吻一名野葛又云秦鉤吻乃並入藥用非此又一種葉似黃精唯花黃莖紫亦呼為鉤吻不可食故經方引與黃精為比言其形色相似也

尚德按甚  
肘後作人  
多二字



通按清漫  
疑是園邊  
廁傍也  
尚德按按  
口疑當作  
校口

備急療諸藥各有其相解者然難常儲今但取一種而兼解毒求之易得者方 甘草濃煮汁多飲之  
無不生也又食少蜜佳

又方 煮桂多飲之又服葱涕佳

又方 煮大豆汁服豉亦解

又方 煮薤芎濃汁飲之祕方卒不及煮便嚼食之亦可散服此藥在諸藥中並解毒

又方 藍青皮子亦通解諸毒可預蓄之急則使用之 凡此諸藥飲汁解毒者雖危急亦不可熱飲之

待冷則解毒熱則不解毒也

集驗療中諸毒藥及菖末死但聞腹中煩冤剝裂作聲如腸胃破斷狀目視一人成兩人或五色光起須臾不救方 取新小便和清邊久尿一升絞取汁一升頓服氣已絕但絞口與之入腹便活也已死萬一

冀活但敷與尿汁也

又療中藥毒方 取竈中當空月下土末服方寸匕

千金中百藥毒方 甘草薤芎大小豆汁藍汁及實汁根汁並解之

又中狼毒毒方 白飯鹽藍汁並解之

又中葵蘆毒方 雄葱汁並解之

又中巴豆毒方 黃連菖蒲小豆藿汁大豆汁並解之

又中躑躅花毒方 梔子汁解之

又中芫花毒方 防風防己甘草桂枝汁並解之

又中射罔毒方 藍汁大小豆汁竹瀝大麻子汁六畜血貝齒屑蚯蚓屎藕芰汁並解之

又中半夏毒方 以生薑汁乾薑解之

又中大戟毒方 葛蒲汁解之

尚德按千金  
分

尚德千金  
甘草蜜各  
四分梁米  
粉一升煎  
令熟如薄  
粥過寒溫  
飲一升  
尚德按二  
枚千金作  
二七枚

又中烏頭大雄附子毒方 用大豆汁遠志防風棗飴糖解之

又中杏仁毒方 用藍汁汁解之

又中莨菪毒方 薺尾甘草升麻犀角蟹汁並解之

又解諸毒雞腸草散方 雞腸草<sub>二</sub>藍子<sub>二</sub>合芍藥<sub>二</sub>甘草<sub>二</sub>分薺尾<sub>二</sub>分墳土<sub>二</sub>分升麻<sub>二</sub>分當歸<sub>二</sub>右八味

為散以水服方寸匕多飲水佳若為蜂蛇等咬毒蟲螫以鍼刺螫上血出著藥如小豆許於瘡中令濕差為射罔箭所中削竹如釵股長一尺五寸以綿纏澆水沾令濕取藥內瘡中隨瘡深淺令至底止有

好血出即差若服毒藥水服毒解痛止愈

又解一切藥發不問草石始覺惡即服方 生麥門冬<sub>二</sub>法慈白<sub>二</sub>各八錢<sub>三</sub>右三味以水七升煮取三升

半分三服

又療一切諸藥毒方 甘草三兩炙以水五升煮取二升內粉一合更煎三兩沸內蜜半兩分服以定止

又解毒藥散方 蒼朮<sub>二</sub>藍葉花<sub>二</sub>取葉並花陰乾<sub>二</sub>右二味搗末以水和服方寸匕日三

又中毒方 取秦鷲毛二枚燒灰以水服之

千金翼療藥毒不止解煩悶方 甘草<sub>二</sub>兩白梁粉<sub>二</sub>升一蜜<sub>二</sub>兩<sub>三</sub>右三味以水三升煮甘草取二升去滓內

粉湯中搗令調下蜜煎令熟如薄粥過寒溫飲一升<sub>同千金</sub>

解諸蛇蟲毒方六首

千金蛇虺百蟲毒方 並用雄黃巴豆並麝香乾薑解之

又蜈蚣毒方 桑汁及葉根汁解之

又蜘蛛毒方 藍青解之

又蜂毒方 蜂房及藍青解之

又斑蝥芫青毒方 猪膏大豆汁戎鹽藍汁鹽湯煮猪膏巴豆並解之



鴉鴉一作鴉  
尚德按證  
類鴉一名  
鴉旦陶隱  
居曰狀如  
黑信雞

尚德按千  
金云雞子  
汁及尿白  
燒猪脂和  
水淋雞屎

又馬刀毒方 清水解之

辨五大毒一首

古今錄驗辨藥有五大毒不可入口方經曰夫藥有大毒不可入口鼻耳目即殺人一曰鈎吻生崖二曰鴉狀黑雄雞生山谷中一名雉三曰除命赤色著木懸其子生山海中四曰海薑狀如龍赤色生海中五曰鴉羽狀如鸛雀黑頭赤足過其毒解之則活卒無藥可飲小便

解金鐵等毒方八首

肘後療金毒已死方 雞矢半升淋取一升飲之可再三千金云雞子清並尿白燒猪脂和服

又方 吞水銀一兩即金出

又方 鴨血雞子並解之千金云及尿汁

又中雄黃毒方 防已解之

又礬石毒方 大豆汁解之千金云及尿白鵝膏

集驗療服金屑死未絕者知是金毒方 以水銀一兩寫口中搖動令下咽喉入腹金則消滅成泥即出

可三與服則活

千金解金銀銅鐵毒方 取鴨屎汁解之

又鐵毒方 磁石解之

惡毒瘡氣毒風腫毒方四首

千金療惡氣瘡毒百毒方 用犀角羚羊角雄黃麝香解之

又主喉腫邪氣惡毒入腹方 升麻射干並解之

又主哽腫毒方 用五香紫檀解之

又甘草湯主天下毒氣及山水露霧毒氣去地風氣瘡癰等毒方 甘草二兩 右一味以水二升煮取一




升分服

父

卷三

腫毒方四首





W 2467 W  
1915  
v. 31